

1. Если вытекающая из раны струя крови ярко-алого цвета, пульсирует и бьет фонтаном, то это кровотечение

- 1) капиллярное
- 2) венозное
- 3) тканевое
- 4) артериальное

2. На стопу, голень и бедро накладывают шину при переломе

- 1) голени
- 2) бедра
- 3) стопы
- 4) тазобедренного сустава

3. Если из раны на руке кровь бьет фонтаном, то следует наложить

- 1) жгут выше места ранения
- 2) жгут на рану
- 3) давящую повязку и ждать образования тромба
- 4) жгут ниже места ранения

4. Наложение шины на сломанную конечность

- 1) предупреждает смещение сломанных костей
- 2) уменьшает отек конечностей
- 3) препятствует проникновению в место перелома микроорганизмов
- 4) уменьшает кровотечение

5. Оказывая доврачебную помощь, нужно положить человека на твердую поверхность лицом вниз при переломе:

- 1) позвоночника
- 2) черепа
- 3) бедра
- 4) ребра

6. Если у человека при ударе ноги в суставе появилась отечность, но сохранилась его подвижность, то это

- 1) ушиб
- 2) вывих сустава
- 3) открытый перелом
- 4) смещение костей

7. Шины накладывают при переломах

- 1) костей черепа
- 2) ребер
- 3) позвонков
- 4) костей голени

**8.** Если транспортировка раненого с наложенным жгутом к врачу продолжается более двух часов, то следует

- 1) затянуть жгут как можно туже
- 2) рядом с первым жгутом наложить второй
- 3) ослабить жгут на некоторое время, а потом вновь затянуть
- 4) снять жгут совсем, чтобы избежать омертвления тканей

**9.** Какое кровотечение характеризует струя крови ярко — алого цвета, пульсирующая и «бьющая фонтаном» из раны?

- 1) капиллярное
- 2) венозное
- 3) тканевое
- 4) артериальное

**10.** Первая доврачебная помощь при артериальном кровотечении состоит в

- 1) наложении шины
- 2) наложении жгута
- 3) обработке раны йодом
- 4) воздействии холодом

**11.** Нельзя применять шину при переломах

- 1) бедра
- 2) ребер
- 3) костей голени
- 4) костей предплечья

**12.** Оказывать медицинскую помощь утопающему необходимо до тех пор, пока

- 1) ему не удалят воду из дыхательных путей
- 2) ему не сделано хотя бы несколько вдуваний воздуха
- 3) его кожа не порозовеет
- 4) он не сможет самостоятельно дышать и не восстановится его сознание

**13.** При оказании первой помощи человеку в случае артериального кровотечения в первую очередь необходимо использовать

- 1) бинт
- 2) йод
- 3) жгут
- 4) вату

**14.** При подозрении на перелом плеча у человека важно

- 1) наложить жгут
- 2) сделать согревающий компресс
- 3) наложить антисептическую повязку
- 4) обеспечить полную неподвижность руки

**15.** На рисунке изображена травма сустава

- 1) перелом кости
- 2) растяжение связок
- 3) вывих сустава
- 4) разрыв связок



**16.** От перегрева организм человека защищается


- 1) сужением кровеносных сосудов кожи
- 2) подъемом волос «дыбом»
- 3) расширением кровеносных сосудов кожи
- 4) увеличением скорости кровотока

**17.** Наиболее легко остановить кровотечение из

- 1) бедренной артерии
- 2) нижней полой вены
- 3) плечевой артерии
- 4) капилляров предплечья

**18.** Какой вид травмы скелета изображён на рисунке?

- 1) перелом кости
- 2) трещина кости
- 3) растяжение связок
- 4) вывих



**19.** Какую доврачебную помощь следует оказать человеку при переломе позвоночника?

- 1) прибинтовать верхние конечности к туловищу
- 2) перебинтовать грудную клетку после глубокого вдоха
- 3) наложить на нижние конечности шины
- 4) уложить на твёрдую прочную поверхность

**20.** Если в рану человека попали частички почвы, то в поликлинике ему обязательно вводят

- 1) донорскую кровь
- 2) противостолбнячную сыворотку
- 3) противодифтерийную сыворотку
- 4) вакцину от бешенства

**21.** До обращения к врачу при оказании первой помощи человеку при вывихе плечевого сустава необходимо

- 1) приложить тёплую грелку
- 2) наложить жгут
- 3) попытаться его вправить
- 4) зафиксировать его повязкой

**22.** При подозрении на перелом плеча у человека важно

- 1) наложить жгут
- 2) сделать согревающий компресс
- 3) наложить антисептическую повязку
- 4) обеспечить полную неподвижность руки


**23.** При какой травме оказывается первая помощь, показанная на рисунках а и б?

- 1) при вывихе
- 2) при ушибе
- 3) при растяжении
- 4) при переломе



**24.** Определите по рисунку, из какого сосуда происходит кровотечение у раненого?

- 1) из бедренной вены
- 2) из подколенной вены
- 3) из бедренной артерии
- 4) из малоберцовой артерии



**25.** При вывихе плечевого сустава необходимо сразу же

- 1) вправить вывих и доставить пострадавшего к врачу
- 2) наложить фиксирующую повязку, приложить лёд и доставить пострадавшего к врачу
- 3) наложить шину и сделать тёплый компресс
- 4) приложить лёд и доставить пострадавшего к врачу

**26.** В первые часы после травмы к повреждённому месту прикладывают холодный предмет, чтобы

- 1) ослабить активность ферментов
- 2) уменьшить кровоизлияние
- 3) усилить кровоток в сосудах
- 4) блокировать деятельность фагоцитов

**27.** Какие суставы надо зафиксировать при переломе плечевой кости?

- 1) локтевой и лучезапястный
- 2) плечевой и лучезапястный
- 3) плечевой и локтевой
- 4) плечевой, локтевой и лучезапястный

**28.** Какие суставы надо зафиксировать при переломе малой берцовой кости?

- 1) бедренный и голеностопный
- 2) бедренный, коленный и голеностопный
- 3) коленный и бедренный
- 4) коленный и голеностопный

**29.** Гиподинамия возникает при

- 1) малоподвижном образе жизни
- 2) физическом перенапряжении
- 3) интенсивных тренировках
- 4) частых пеших прогулках

**30.** На какое максимальное время рекомендуется летом накладывать жгут при артериальном кровотечении?

- 1) 1 час
- 2) 2 часа
- 3) 3 часа
- 4) 4 часа

**31.** При ранении лёгкого в первую очередь необходимо

- 1) провести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца
- 2) уложить больного на спину и ждать приезда врача
- 3) доставить пострадавшего в медицинское учреждение
- 4) перевязать рану, зафиксировав грудную клетку на выдохе

**32.** Какое заболевание распространяется воздушно-капельным путём?

- 1) сахарный диабет
- 2) брюшной тиф
- 3) грипп
- 4) язва желудка

**33.** Первым действием при открытом переломе голени является

- 1) накладывание шины
- 2) наложение марлевой повязки
- 3) остановка кровотечения
- 4) доставка больного в травматологический пункт

**34.** При ожоге руки кислотой необходимо место ожога сразу

- 1) смазать растительным маслом
- 2) промыть водой
- 3) наложить стерильную повязку
- 4) вызвать врача и не прикасаться к больному

**35.** При растяжении в голеностопном суставе пострадавшему необходимо

- 1) наложить шину
- 2) вызвать скорую помощь
- 3) наложить тугую повязку
- 4) не принимать никаких мер